

HERBISIDA

GRUP

K3 | E

HERBISIDA

PENOXSTAR

Bahan aktif: butaklor 500 g/l + oksadiazon 100 g/l

500/100 EC

Tumbuh Subur Tanpa Gulma

Herbisida sistemik pra tumbuh dan purna tumbuh berbentuk pekatan yang dapat diemulsikan, untuk mengendalikan gulma pada pertanaman padi sawah (tapin).



Lahan Kering



Lahan Basah



Pemegang Nomor Pendaftaran:
PT ETONG CHEMICAL INDONESIA
Ruko Prominence Blok 38 E No. 51
Jl. Jalur Sutra Boulevard Kel. Panunggangan Timur
Kec. Pinang Kota Tangerang Banten 15143

 etongchem.id

Nomor Pendaftaran: RI. 01030120248530

PETUNJUK PENGGUNAAN

Tanaman	Gulma	Dosis Formulasi	Cara dan Waktu Aplikasi
Budidaya Padi Sawah (Tapin)	Gulma berdaun lebar: <ul style="list-style-type: none">• <i>Monochoria vaginalis</i>• <i>Ludwigia octovalvis</i>	1,5 – 2 l/ha	Penyemprotan volume tinggi Aplikasi dilakukan pada saat sebelum tanam atau 1-2 hari setelah tanam. Apabila belum jelas hubungi petugas pertanian yang berwenang.
	Gulma golongan rumput: <ul style="list-style-type: none">• <i>Echinochloa cruss-galli</i>	1,5 – 2 l/ha	
	Teki: <ul style="list-style-type: none">• <i>Cyperus diformis</i>	1,5 – 2 l/ha	

CARA APLIKASI



Lahan kering



Lahan tergenang air



Di dalam air

KEUNGGULAN



Mudah di aplikasikan



Lebih lama menekan biji gulma



Dapat mengendalikan biji gulma di bawah air



Menekan segala jenis gulma